

# Introdução

## Algoritmos em Grafos

Marco A L Barbosa



Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-Compartilhalgual 4.0 Internacional.

# Conteúdo

Histórico

Definições e propriedades

Caminhos e ciclos

Conexidade

Isomorfismo

Subgrafos

Versões orientada e não orientada

Vizinho

Grafos com nomes especiais

Variantes de grafos

Referências

O estudo utilizando apenas este material **não é suficiente** para o entendimento do conteúdo. Recomendamos a leitura das referências no final deste material e a resolução (por parte do aluno) de todos os exercícios indicados.


# Histórico

# Histórico

- ▶ Em 1736 Leonhard Euler propôs e resolveu o problema das sete pontes de Königsberg
- ▶ A cidade de Königsberg era cortada por um rio que continha duas ilhas
- ▶ Existiam 7 pontes que ligavam as ilhas e as margens do rios
- ▶ O problema consistia em encontrar um caminho que cruzasse cada uma das 7 pontes uma única vez
- ▶ Existe tal caminho?



# Histórico

- ▶ Euler formulou o problema em termos abstratos






# Histórico

- ▶ Euler formulou o problema em termos abstratos



# Histórico

- ▶ Euler formulou o problema em termos abstratos





# Histórico


- ▶ Euler observou que toda vez que alguém atinge uma porção de terra por uma ponte, deve deixar a porção de terra também por uma ponte
- ▶ Para que cada ponte fosse cruzada apenas uma vez, todas as porções de terra, exceto talvez a inicial e a final, deveriam ter um número par de pontes ligadas a ela
- ▶ Mas todas as porções de terra do problema tem um número ímpar de pontes
- ▶ Com esta observação, Euler mostrou que não é possível fazer o percurso
- ▶ Surgiu a área da matemática que é conhecida como Teoria dos Grafos

## Definições e propriedades


# Definições e propriedades

- ▶ Um **grafo orientado**  $G$  é um par  $(V, E)$ , onde
  - ▶  $V$  é um conjunto finito, chamado de **conjunto de vértices**
  - ▶  $E$  é uma relação binária em  $V$ , chamado de **conjunto de arestas**
- ▶ Em um **grafo não orientado**  $G = (V, E)$ ,  $E$  consiste de pares de vértices não ordenados
- ▶ Os grafos podem ser representados graficamente
  - ▶ Os vértices são desenhados como círculos
  - ▶ As arestas são desenhadas como curvas ligando dois círculos, no caso de grafos orientados, as curvas tem um seta em uma das extremidades


## Definições e propriedades



(a)



(b)




(c)


Figura: B-2

- ▶ Na figura B-2-a, qual é o conjunto de vértices e o conjunto de arestas?


## Definições e propriedades



(a)



(b)



(c)


Figura: B-2

- ▶ Na figura B-2-a, qual é o conjunto de vértices e o conjunto de arestas?


$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

$$E = \{(1, 2), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (4, 1), (4, 5), (5, 4), (6, 3)\}$$


## Definições e propriedades



(a)



(b)



(c)

Figura: B-2

- ▶ Na figura B-2-a, qual é o conjunto de vértices e o conjunto de arestas?  
 $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ,  
 $E = \{(1, 2), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (4, 1), (4, 5), (5, 4), (6, 3)\}$
- ▶ Na figura B-2-b, qual é o conjunto de vértices e o conjunto de arestas?

## Definições e propriedades




Figura: B-2

- ▶ Na figura B-2-a, qual é o conjunto de vértices e o conjunto de arestas?

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

$$E = \{(1, 2), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (4, 1), (4, 5), (5, 4), (6, 3)\}$$

- ▶ Na figura B-2-b, qual é o conjunto de vértices e o conjunto de arestas?

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, E = \{(1, 2), (1, 5), (2, 5), (3, 6)\}$$

## Definições e propriedades




Figura: B-2

### ► Observações

- Em grafos orientados são permitidos **autoloops** (arestas de um vértice para ele mesmo). Em grafos não orientados não são permitidos. Exemplo: aresta (2,2) da figura B-2-a
- Um grafo orientado sem autoloops é chamado de **grafo simples**
- Para grafos não orientados, definimos a convenção de utilizar  $(u, v)$  para uma aresta, ao invés da notação de conjunto  $\{u, v\}$ .  $(u, v)$  e  $(v, u)$  são consideradas a mesma aresta



## Definições e propriedades

- ▶ Para uma aresta  $(u, v)$  em um grafo orientado, dizemos que
  - ▶  $(u, v)$  é **incidente do** ou **sai do** vértice  $u$  e é **incidente no** ou **entra no** vértice  $v$

## Definições e propriedades

- ▶ Para uma aresta  $(u, v)$  em um grafo orientado, dizemos que
  - ▶  $(u, v)$  é **incidente do** ou **sai do** vértice  $u$  e é **incidente no** ou **entra no** vértice  $v$
  - ▶ Quais as arestas que saem do vértice 2 na figura B-2-a?

## Definições e propriedades

- ▶ Para uma aresta  $(u, v)$  em um grafo orientado, dizemos que
  - ▶  $(u, v)$  é **incidente do** ou **sai do** vértice  $u$  e é **incidente no** ou **entra no** vértice  $v$
  - ▶ Quais as arestas que saem do vértice 2 na figura B-2-a?  
 $(2, 2)$ ,  $(2, 4)$  e  $(2, 5)$

## Definições e propriedades

- ▶ Para uma aresta  $(u, v)$  em um grafo orientado, dizemos que
  - ▶  $(u, v)$  é **incidente do** ou **sai do** vértice  $u$  e é **incidente no** ou **entra no** vértice  $v$
  - ▶ Quais as arestas que saem do vértice 2 na figura B-2-a?  
(2, 2), (2, 4) e (2, 5)
  - ▶ Quais as arestas que entram no vértice 2 na figura B-2-a?

## Definições e propriedades

- ▶ Para uma aresta  $(u, v)$  em um grafo orientado, dizemos que
  - ▶  $(u, v)$  é **incidente do** ou **sai do** vértice  $u$  e é **incidente no** ou **entra no** vértice  $v$
  - ▶ Quais as arestas que saem do vértice 2 na figura B-2-a?  
(2, 2), (2, 4) e (2, 5)
  - ▶ Quais as arestas que entram no vértice 2 na figura B-2-a?  
(1, 2) e (2, 2)

## Definições e propriedades

- ▶ Para uma aresta  $(u, v)$  em um grafo orientado, dizemos que
  - ▶  $(u, v)$  é **incidente do** ou **sai do** vértice  $u$  e é **incidente no** ou **entra no** vértice  $v$
  - ▶ Quais as arestas que saem do vértice 2 na figura B-2-a?  
(2, 2), (2, 4) e (2, 5)
  - ▶ Quais as arestas que entram no vértice 2 na figura B-2-a?  
(1, 2) e (2, 2)
- ▶ Para uma aresta  $(u, v)$  em um grafo não orientado, dizemos que
  - ▶  $(u, v)$  é **incidente** nos vértices  $u$  e  $v$

# Definições e propriedades

- ▶ Para uma aresta  $(u, v)$  em um grafo orientado, dizemos que
  - ▶  $(u, v)$  é **incidente do** ou **sai do** vértice  $u$  e é **incidente no** ou **entra no** vértice  $v$
  - ▶ Quais as arestas que saem do vértice 2 na figura B-2-a?  
(2, 2), (2, 4) e (2, 5)
  - ▶ Quais as arestas que entram no vértice 2 na figura B-2-a?  
(1, 2) e (2, 2)
- ▶ Para uma aresta  $(u, v)$  em um grafo não orientado, dizemos que
  - ▶  $(u, v)$  é **incidente** nos vértices  $u$  e  $v$
  - ▶ Quais são as arestas incidentes no vértice 2 da figura B-2-b?

# Definições e propriedades

- ▶ Para uma aresta  $(u, v)$  em um grafo orientado, dizemos que
  - ▶  $(u, v)$  é **incidente do** ou **sai do** vértice  $u$  e é **incidente no** ou **entra no** vértice  $v$
  - ▶ Quais as arestas que saem do vértice 2 na figura B-2-a?  
(2, 2), (2, 4) e (2, 5)
  - ▶ Quais as arestas que entram no vértice 2 na figura B-2-a?  
(1, 2) e (2, 2)
- ▶ Para uma aresta  $(u, v)$  em um grafo não orientado, dizemos que
  - ▶  $(u, v)$  é **incidente** nos vértices  $u$  e  $v$
  - ▶ Quais são as arestas incidentes no vértice 2 da figura B-2-b?  
(1, 2) e (2, 5)



## Definições e propriedades

- ▶ Para uma aresta  $(u, v)$ , dizemos que o vértice  $v$  é **adjacente** ao vértice  $u$
- ▶ Para grafos não orientados, a relação de adjacência é simétrica
- ▶ Se  $v$  é adjacente a  $u$  em um grafo orientado, escrevemos  $u \rightarrow v$

## Definições e propriedades

- ▶ Para uma aresta  $(u, v)$ , dizemos que o vértice  $v$  é **adjacente** ao vértice  $u$
- ▶ Para grafos não orientados, a relação de adjacência é simétrica
- ▶ Se  $v$  é adjacente a  $u$  em um grafo orientado, escrevemos  $u \rightarrow v$
- ▶ O vértice 1 é adjacente ao vértice 2 na figura B-2-b?

## Definições e propriedades

- ▶ Para uma aresta  $(u, v)$ , dizemos que o vértice  $v$  é **adjacente** ao vértice  $u$
- ▶ Para grafos não orientados, a relação de adjacência é simétrica
- ▶ Se  $v$  é adjacente a  $u$  em um grafo orientado, escrevemos  $u \rightarrow v$
- ▶ O vértice 1 é adjacente ao vértice 2 na figura B-2-b? Sim.

## Definições e propriedades

- ▶ Para uma aresta  $(u, v)$ , dizemos que o vértice  $v$  é **adjacente** ao vértice  $u$
- ▶ Para grafos não orientados, a relação de adjacência é simétrica
- ▶ Se  $v$  é adjacente a  $u$  em um grafo orientado, escrevemos  $u \rightarrow v$
- ▶ O vértice 1 é adjacente ao vértice 2 na figura B-2-b? Sim. E na figura B-2-a?

## Definições e propriedades

- ▶ Para uma aresta  $(u, v)$ , dizemos que o vértice  $v$  é **adjacente** ao vértice  $u$
- ▶ Para grafos não orientados, a relação de adjacência é simétrica
- ▶ Se  $v$  é adjacente a  $u$  em um grafo orientado, escrevemos  $u \rightarrow v$
- ▶ O vértice 1 é adjacente ao vértice 2 na figura B-2-b? Sim. E na figura B-2-a? Não, pois não existe a aresta  $(2, 1)$

## Definições e propriedades

- ▶ Em um grafo não orientado
  - ▶ O **grau** de um vértice é o número de arestas incidentes nele

## Definições e propriedades

- ▶ Em um grafo não orientado
  - ▶ O **grau** de um vértice é o número de arestas incidentes nele
  - ▶ Na figura B-2-b, qual é o grau do vértice 2?

## Definições e propriedades

- ▶ Em um grafo não orientado
  - ▶ O **grau** de um vértice é o número de arestas incidentes nele
  - ▶ Na figura B-2-b, qual é o grau do vértice 2? 2



# Definições e propriedades

- ▶ Em um grafo não orientado
  - ▶ O **grau** de um vértice é o número de arestas incidentes nele
  - ▶ Na figura B-2-b, qual é o grau do vértice 2? 2
- ▶ Em um grafo orientado
  - ▶ O **grau de saída** de um vértice é o número de arestas que saem dele
  - ▶ O **grau de entrada** de um vértice é o número de arestas que entram nele
  - ▶ O **grau** de um vértice é soma do grau de saída e do grau de entrada

# Definições e propriedades

- ▶ Em um grafo não orientado
  - ▶ O **grau** de um vértice é o número de arestas incidentes nele
  - ▶ Na figura B-2-b, qual é o grau do vértice 2? 2
- ▶ Em um grafo orientado
  - ▶ O **grau de saída** de um vértice é o número de arestas que saem dele
  - ▶ O **grau de entrada** de um vértice é o número de arestas que entram nele
  - ▶ O **grau** de um vértice é soma do grau de saída e do grau de entrada
  - ▶ Na figura B-2-a, qual é o grau de entrada, o grau de saída e o grau do vértice 2?

# Definições e propriedades

- ▶ Em um grafo não orientado
  - ▶ O **grau** de um vértice é o número de arestas incidentes nele
  - ▶ Na figura B-2-b, qual é o grau do vértice 2? 2
- ▶ Em um grafo orientado
  - ▶ O **grau de saída** de um vértice é o número de arestas que saem dele
  - ▶ O **grau de entrada** de um vértice é o número de arestas que entram nele
  - ▶ O **grau** de um vértice é soma do grau de saída e do grau de entrada
  - ▶ Na figura B-2-a, qual é o grau de entrada, o grau de saída e o grau do vértice 2? 2, 3 e 5

# Definições e propriedades

- ▶ Em um grafo não orientado
  - ▶ O **grau** de um vértice é o número de arestas incidentes nele
  - ▶ Na figura B-2-b, qual é o grau do vértice 2? 2
- ▶ Em um grafo orientado
  - ▶ O **grau de saída** de um vértice é o número de arestas que saem dele
  - ▶ O **grau de entrada** de um vértice é o número de arestas que entram nele
  - ▶ O **grau** de um vértice é soma do grau de saída e do grau de entrada
  - ▶ Na figura B-2-a, qual é o grau de entrada, o grau de saída e o grau do vértice 2? 2, 3 e 5
- ▶ Um vértice **isolado** tem grau 0

# Definições e propriedades

- ▶ Em um grafo não orientado
  - ▶ O **grau** de um vértice é o número de arestas incidentes nele
  - ▶ Na figura B-2-b, qual é o grau do vértice 2? 2
- ▶ Em um grafo orientado
  - ▶ O **grau de saída** de um vértice é o número de arestas que saem dele
  - ▶ O **grau de entrada** de um vértice é o número de arestas que entram nele
  - ▶ O **grau** de um vértice é soma do grau de saída e do grau de entrada
  - ▶ Na figura B-2-a, qual é o grau de entrada, o grau de saída e o grau do vértice 2? 2, 3 e 5
- ▶ Um vértice **isolado** tem grau 0
  - ▶ Existe algum vértice isolado nos grafos da figura B-2?

# Definições e propriedades

- ▶ Em um grafo não orientado
  - ▶ O **grau** de um vértice é o número de arestas incidentes nele
  - ▶ Na figura B-2-b, qual é o grau do vértice 2? 2
- ▶ Em um grafo orientado
  - ▶ O **grau de saída** de um vértice é o número de arestas que saem dele
  - ▶ O **grau de entrada** de um vértice é o número de arestas que entram nele
  - ▶ O **grau** de um vértice é soma do grau de saída e do grau de entrada
  - ▶ Na figura B-2-a, qual é o grau de entrada, o grau de saída e o grau do vértice 2? 2, 3 e 5
- ▶ Um vértice **isolado** tem grau 0
  - ▶ Existe algum vértice isolado nos grafos da figura B-2? Sim, o vértice 4 da figura B-2-b

## Caminhos e ciclos

## Caminhos e ciclos

- ▶ Um **caminho** de **comprimento k** de um vértice  $u$  até um vértice  $u'$  em um grafo  $G = (V, E)$  é uma sequência  $\langle v_0, v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$  de vértices tal que  $u = v_0$ ,  $u' = v_k$  e  $(v_{i-1}, v_i) \in E$  para  $i = 1, 2, \dots, k$
- ▶ O comprimento do caminho é a quantidade de aresta no caminho
- ▶ O caminho **contém** os vértice  $v_0, v_1, \dots, v_k$  e as arestas  $(v_0, v_1), (v_1, v_2), \dots, (v_{k-1}, v_k)$
- ▶ Se existe um caminho  $p$  de  $u$  até  $u'$ , dizemos que  $u'$  é **acessível** a partir de  $u$  via  $p$ , ou  $u \overset{p}{\rightsquigarrow} u'$  se o grafo é orientado
- ▶ Sempre existe um caminho de comprimento 0 de  $u$  para  $u$
- ▶ Exemplos da figura B-2-a:  $\langle 1, 2, 5, 4 \rangle$ ,  $\langle 2, 5, 4, 5 \rangle$  e  $\langle 3 \rangle$



## Caminhos e ciclos

- ▶ Um caminho é **simple**s se todos os vértices no caminho são distintos
- ▶ Existe um caminho de tamanho 5 no grafo da figura B-2-a?

## Caminhos e ciclos

- ▶ Um caminho é **simples** se todos os vértices no caminho são distintos
- ▶ Existe um caminho de tamanho 5 no grafo da figura B-2-a?  
Sim. Por exemplo,  $\langle 1, 2, 5, 4, 1, 2 \rangle$

## Caminhos e ciclos

- ▶ Um caminho é **simples** se todos os vértices no caminho são distintos
- ▶ Existe um caminho de tamanho 5 no grafo da figura B-2-a?  
Sim. Por exemplo,  $\langle 1, 2, 5, 4, 1, 2 \rangle$
- ▶ Existe um caminho simples de tamanho 5 no grafo da figura B-2-a?

## Caminhos e ciclos

- ▶ Um caminho é **simples** se todos os vértices no caminho são distintos
- ▶ Existe um caminho de tamanho 5 no grafo da figura B-2-a?  
Sim. Por exemplo,  $\langle 1, 2, 5, 4, 1, 2 \rangle$
- ▶ Existe um caminho simples de tamanho 5 no grafo da figura B-2-a? Não

# Caminhos e ciclos

- ▶ Um **subcaminho** do caminho  $p = \langle v_0, v_1, \dots, v_k \rangle$  é uma subsequência contígua de seus vértices
- ▶ Em um grafo orientado
  - ▶ Um caminho  $\langle v_0, v_1, \dots, v_k \rangle$  forma um **ciclo** se  $v_0 = v_k$  e o caminho contém pelo menos uma aresta
  - ▶ O ciclo é **simples** se além disso  $v_1, v_2, \dots, v_k$  são distintos
  - ▶ Dois caminhos  $\langle v_0, v_1, \dots, v_{k-1}, v_0 \rangle$  e  $\langle v'_0, v'_1, \dots, v'_{k-1}, v'_0 \rangle$  formam o mesmo ciclo se existe um inteiro  $j$  tal que  $v'_i = v_{(i+j) \bmod k}$  para  $i = 0, 1, \dots, k - 1$ 
    - ▶ Considerando a figura B-2-a, dê dois caminhos que formam o mesmo ciclo que o caminho  $\langle 1, 2, 4, 1 \rangle$ .

## Caminhos e ciclos

- ▶ Um **subcaminho** do caminho  $p = \langle v_0, v_1, \dots, v_k \rangle$  é uma subsequência contígua de seus vértices
- ▶ Em um grafo orientado
  - ▶ Um caminho  $\langle v_0, v_1, \dots, v_k \rangle$  forma um **ciclo** se  $v_0 = v_k$  e o caminho contém pelo menos uma aresta
  - ▶ O ciclo é **simples** se além disso  $v_1, v_2, \dots, v_k$  são distintos
  - ▶ Dois caminhos  $\langle v_0, v_1, \dots, v_{k-1}, v_0 \rangle$  e  $\langle v'_0, v'_1, \dots, v'_{k-1}, v'_0 \rangle$  formam o mesmo ciclo se existe um inteiro  $j$  tal que  $v'_i = v_{(i+j) \bmod k}$  para  $i = 0, 1, \dots, k - 1$ 
    - ▶ Considerando a figura B-2-a, dê dois caminhos que formam o mesmo ciclo que o caminho  $\langle 1, 2, 4, 1 \rangle$ .  $\langle 2, 4, 1, 2 \rangle$  e  $\langle 4, 1, 2, 4 \rangle$

# Caminhos e ciclos

- ▶ Em um grafo não orientado
  - ▶ Um caminho  $\langle v_0, v_1, \dots, v_k \rangle$  forma um **ciclo** se  $k > 0$ ,  $v_0 = v_k$  e todas as arestas do caminho são distintas
  - ▶ O ciclo é **simples** se  $v_1, v_2, \dots, v_k$  são distintos
- ▶ Um grafo sem ciclo é **acíclico**

Conexidade



# Conexidade

- ▶ Um grafo não orientado é **conexo** se cada vértice é acessível a partir de todos os outros

# Conexidade

- ▶ Um grafo não orientado é **conexo** se cada vértice é acessível a partir de todos os outros
- ▶ Os **componentes conexos** de um grafo são as classes de equivalência de vértices sob a relação “é acessível a partir de”
  - ▶ Na figura B-2-b quais são os componentes conexos?

# Conexidade

- ▶ Um grafo não orientado é **conexo** se cada vértice é acessível a partir de todos os outros
- ▶ Os **componentes conexos** de um grafo são as classes de equivalência de vértices sob a relação “é acessível a partir de”
  - ▶ Na figura B-2-b quais são os componentes conexos?  $\{1, 2, 5\}$ ,  $\{3, 6\}$  e  $\{4\}$

# Conexidade

- ▶ Um grafo não orientado é **conexo** se cada vértice é acessível a partir de todos os outros
- ▶ Os **componentes conexos** de um grafo são as classes de equivalência de vértices sob a relação “é acessível a partir de”
  - ▶ Na figura B-2-b quais são os componentes conexos?  $\{1, 2, 5\}$ ,  $\{3, 6\}$  e  $\{4\}$
- ▶ Um grafo não orientado é conexo se tem exatamente um componente conexo

## Conexidade

- ▶ Um grafo orientado é **fortemente conexo** se para cada par de vértices  $(u, v)$ ,  $v$  é acessível a partir de  $u$
- ▶ Os **componentes fortemente conexos** de um grafo orientado são as classes de equivalência de vértices sob a relação “são mutuamente acessíveis”

## Conexidade

- ▶ Um grafo orientado é **fortemente conexo** se para cada par de vértices  $(u, v)$ ,  $v$  é acessível a partir de  $u$
- ▶ Os **componentes fortemente conexos** de um grafo orientado são as classes de equivalência de vértices sob a relação “são mutuamente acessíveis”
- ▶ Um grafo orientado é fortemente conexo se ele só tem um componente fortemente conexo
  - ▶ Quais os componentes fortemente conexos da figura B-2-a?

## Conexidade

- ▶ Um grafo orientado é **fortemente conexo** se para cada par de vértices  $(u, v)$ ,  $v$  é acessível a partir de  $u$
- ▶ Os **componentes fortemente conexos** de um grafo orientado são as classes de equivalência de vértices sob a relação “são mutuamente acessíveis”
- ▶ Um grafo orientado é fortemente conexo se ele só tem um componente fortemente conexo
  - ▶ Quais os componentes fortemente conexos da figura B-2-a?  
 $\{1, 2, 4, 5\}$

## Conexidade

- ▶ Um grafo orientado é **fortemente conexo** se para cada par de vértices  $(u, v)$ ,  $v$  é acessível a partir de  $u$
- ▶ Os **componentes fortemente conexos** de um grafo orientado são as classes de equivalência de vértices sob a relação “são mutuamente acessíveis”
- ▶ Um grafo orientado é fortemente conexo se ele só tem um componente fortemente conexo
  - ▶ Quais os componentes fortemente conexos da figura B-2-a?  
 $\{1, 2, 4, 5\}$  ,  $\{3\}$  e  $\{6\}$



# Conexidade

- ▶ Um grafo orientado é **fortemente conexo** se para cada par de vértices  $(u, v)$ ,  $v$  é acessível a partir de  $u$
- ▶ Os **componentes fortemente conexos** de um grafo orientado são as classes de equivalência de vértices sob a relação “são mutuamente acessíveis”
- ▶ Um grafo orientado é fortemente conexo se ele só tem um componente fortemente conexo
  - ▶ Quais os componentes fortemente conexos da figura B-2-a?  
 $\{1, 2, 4, 5\}$  ,  $\{3\}$  e  $\{6\}$
  - ▶ Todos os pares de vértices em  $\{1, 2, 4, 5\}$  são mutuamente acessíveis

# Conexidade

- ▶ Um grafo orientado é **fortemente conexo** se para cada par de vértices  $(u, v)$ ,  $v$  é acessível a partir de  $u$
- ▶ Os **componentes fortemente conexos** de um grafo orientado são as classes de equivalência de vértices sob a relação “são mutuamente acessíveis”
- ▶ Um grafo orientado é fortemente conexo se ele só tem um componente fortemente conexo
  - ▶ Quais os componentes fortemente conexos da figura B-2-a?  $\{1, 2, 4, 5\}$ ,  $\{3\}$  e  $\{6\}$
  - ▶ Todos os pares de vértices em  $\{1, 2, 4, 5\}$  são mutuamente acessíveis
  - ▶ Os vértices  $\{3, 6\}$  não formam um componente fortemente conexo. Por quê?

# Conexidade

- ▶ Um grafo orientado é **fortemente conexo** se para cada par de vértices  $(u, v)$ ,  $v$  é acessível a partir de  $u$
- ▶ Os **componentes fortemente conexos** de um grafo orientado são as classes de equivalência de vértices sob a relação “são mutuamente acessíveis”
- ▶ Um grafo orientado é fortemente conexo se ele só tem um componente fortemente conexo
  - ▶ Quais os componentes fortemente conexos da figura B-2-a?  $\{1, 2, 4, 5\}$ ,  $\{3\}$  e  $\{6\}$
  - ▶ Todos os pares de vértices em  $\{1, 2, 4, 5\}$  são mutuamente acessíveis
  - ▶ Os vértices  $\{3, 6\}$  não formam um componente fortemente conexo. Por quê? O vértice 6 não pode ser acessado a partir do vértice 3

Isomorfismo

# Isomorfismo

- ▶ Dois grafos  $G = (V, E)$  e  $G' = (V', E')$  são **isomorfos** se existe uma bijeção  $f : V \rightarrow V'$  tal que  $(u, v) \in E$  se e somente se  $(f(u), f(v)) \in E'$ 
  - ▶ Podemos identificar os vértices de  $G$  como vértices de  $G'$ , mantendo as arestas correspondentes em  $G$  e  $G'$

# Isomorfismo




Figura: B-3

# Isomorfismo

- ▶ Os grafos da figura B-3-a são isomorfos entre si?
  - ▶  $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  e  $V' = \{u, v, w, x, y, z\}$

# Isomorfismo

- ▶ Os grafos da figura B-3-a são isomorfos entre si?
  - ▶  $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  e  $V' = \{u, v, w, x, y, z\}$
  - ▶  $|V| = 6$  e  $|V'| = 6$  ;  $|E| = 9$  e  $|E'| = 9$



# Isomorfismo

- ▶ Os grafos da figura B-3-a são isomorfos entre si?
  - ▶  $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  e  $V' = \{u, v, w, x, y, z\}$
  - ▶  $|V| = 6$  e  $|V'| = 6$  ;  $|E| = 9$  e  $|E'| = 9$
  - ▶ Mapeamento de  $V$  para  $V'$  dado pela função bijetora  
 $f(1) = u, f(2) = v, f(3) = w, f(4) = x, f(5) = y, f(6) = z$

# Isomorfismo

- ▶ Os grafos da figura B-3-a são isomorfos entre si?
  - ▶  $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  e  $V' = \{u, v, w, x, y, z\}$
  - ▶  $|V| = 6$  e  $|V'| = 6$  ;  $|E| = 9$  e  $|E'| = 9$
  - ▶ Mapeamento de  $V$  para  $V'$  dado pela função bijetora  
 $f(1) = u, f(2) = v, f(3) = w, f(4) = x, f(5) = y, f(6) = z$
  - ▶ Sim, são isomorfos

# Isomorfismo

- ▶ Os grafos da figura B-3-b, são isomorfos?
  - ▶  $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  e  $V' = \{u, v, w, x, y\}$

# Isomorfismo

- ▶ Os grafos da figura B-3-b, são isomorfos?
  - ▶  $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  e  $V' = \{u, v, w, x, y\}$
  - ▶  $|V| = 5$  e  $|V'| = 5$ ;  $|E| = 7$  e  $|E'| = 7$

# Isomorfismo

- ▶ Os grafos da figura B-3-b, são isomorfos?
  - ▶  $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  e  $V' = \{u, v, w, x, y\}$
  - ▶  $|V| = 5$  e  $|V'| = 5$ ;  $|E| = 7$  e  $|E'| = 7$
  - ▶  $G$  tem um vértice de grau 4, mas  $G'$  não tem

# Isomorfismo

- ▶ Os grafos da figura B-3-b, são isomorfos?
  - ▶  $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  e  $V' = \{u, v, w, x, y\}$
  - ▶  $|V| = 5$  e  $|V'| = 5$ ;  $|E| = 7$  e  $|E'| = 7$
  - ▶  $G$  tem um vértice de grau 4, mas  $G'$  não tem
  - ▶ Não são isomorfos

## Subgrafos

# Subgrafos

- ▶  $G' = (V', E')$  é um **subgrafo** de  $G = (V, E)$  se  $V' \subseteq V$  e  $E' \subseteq E$



# Subgrafos

- ▶  $G' = (V', E')$  é um **subgrafo** de  $G = (V, E)$  se  $V' \subseteq V$  e  $E' \subseteq E$
- ▶ Dado um conjunto  $V'$  de modo que  $V' \subseteq V$ , o subgrafo de  $G$  **induzido** por  $V'$  é o grafo  $G' = (V', E')$ , onde  $E' = \{(u, v) \in E : u, v \in V'\}$
- ▶ Qual é o subgrafo induzido pelo conjunto de vértices  $\{1, 2, 3, 6\}$  na figura B-2-a?

# Subgrafos

- ▶  $G' = (V', E')$  é um **subgrafo** de  $G = (V, E)$  se  $V' \subseteq V$  e  $E' \subseteq E$
- ▶ Dado um conjunto  $V'$  de modo que  $V' \subseteq V$ , o subgrafo de  $G$  **induzido** por  $V'$  é o grafo  $G' = (V', E')$ , onde  $E' = \{(u, v) \in E : u, v \in V'\}$
- ▶ Qual é o subgrafo induzido pelo conjunto de vértices  $\{1, 2, 3, 6\}$  na figura B-2-a?  
 $G = (\{1, 2, 3, 6\}, \{(1, 2), (2, 2), (6, 3)\})$

Versões orientada e não orientada

## Versões orientada e não orientada

- ▶ Dado um grafo não orientado  $G = (V, E)$ , a **versão orientada** de  $G$  é o grafo orientado  $G' = (V, E')$ , onde  $(u, v) \in E'$  se e somente se  $(u, v) \in E$ 
  - ▶ Cada aresta não orientada  $(u, v)$  em  $G$  é substituída na versão orientada pelas duas arestas orientadas  $(u, v)$  e  $(v, u)$

## Versões orientada e não orientada

- ▶ Dado um grafo não orientado  $G = (V, E)$ , a **versão orientada** de  $G$  é o grafo orientado  $G' = (V, E')$ , onde  $(u, v) \in E'$  se e somente se  $(u, v) \in E$ 
  - ▶ Cada aresta não orientada  $(u, v)$  em  $G$  é substituída na versão orientada pelas duas arestas orientadas  $(u, v)$  e  $(v, u)$
- ▶ Dado um grafo orientado  $G = (V, E)$ , a **versão não orientada** de  $G$  é o grafo não orientado  $G' = (V, E')$ , onde  $(u, v) \in E'$  se e somente se  $u \neq v$  e  $(u, v) \in E$ 
  - ▶ A versão não orientada contém as arestas de  $G$  “com suas orientações removidas” e autoloops eliminados

## Versões orientada e não orientada

- ▶ Dado um grafo não orientado  $G = (V, E)$ , a **versão orientada** de  $G$  é o grafo orientado  $G' = (V, E')$ , onde  $(u, v) \in E'$  se e somente se  $(u, v) \in E$ 
  - ▶ Cada aresta não orientada  $(u, v)$  em  $G$  é substituída na versão orientada pelas duas arestas orientadas  $(u, v)$  e  $(v, u)$
- ▶ Dado um grafo orientado  $G = (V, E)$ , a **versão não orientada** de  $G$  é o grafo não orientado  $G' = (V, E')$ , onde  $(u, v) \in E'$  se e somente se  $u \neq v$  e  $(u, v) \in E$ 
  - ▶ A versão não orientada contém as arestas de  $G$  “com suas orientações removidas” e autoloops eliminados
  - ▶ Mesmo que o grafo orientado contenha as arestas  $(u, v)$  e  $(v, u)$ , o grafo não orientado conterá  $(u, v)$  somente uma vez

Vizinho

# Vizinho

- ▶ Em um grafo orientado, um vizinho de um vértice  $u$  é qualquer vértice que seja adjacente a  $u$  na versão não orientada
  - ▶  $v$  é **vizinho** de  $u$  se  $(u, v) \in E$  ou  $(v, u) \in E$



# Vizinho

- ▶ Em um grafo orientado, um vizinho de um vértice  $u$  é qualquer vértice que seja adjacente a  $u$  na versão não orientada
  - ▶  $v$  é **vizinho** de  $u$  se  $(u, v) \in E$  ou  $(v, u) \in E$
- ▶ Em um grafo não orientado,  $u$  e  $v$  são vizinhos se são adjacentes

## Grafos com nomes especiais

## Grafos com nomes especiais

- ▶ **Grafo completo** é um grafo não orientado no qual todo par de vértices é adjacente
- ▶ Um grafo completo com  $n$  vértices é chamado de  $K_n$

## Grafos com nomes especiais

- ▶ **Grafo completo** é um grafo não orientado no qual todo par de vértices é adjacente
- ▶ Um grafo completo com  $n$  vértices é chamado de  $K_n$
- ▶ **Grafo bipartido** é um grafo não orientado  $G = (V, E)$  em que  $V$  pode ser particionado em dois conjuntos  $V_1$  e  $V_2$  tais que  $(u, v) \in E$  implica que  
 $u \in V_1$  e  $v \in V_2$  ou  
 $u \in V_2$  e  $v \in V_1$ 
  - ▶ Todas as arestas ficam entre os dois conjuntos  $V_1$  e  $V_2$

## Grafos com nomes especiais

- ▶ **Grafo completo** é um grafo não orientado no qual todo par de vértices é adjacente
- ▶ Um grafo completo com  $n$  vértices é chamado de  $K_n$
- ▶ **Grafo bipartido** é um grafo não orientado  $G = (V, E)$  em que  $V$  pode ser particionado em dois conjuntos  $V_1$  e  $V_2$  tais que  $(u, v) \in E$  implica que  
 $u \in V_1$  e  $v \in V_2$  ou  
 $u \in V_2$  e  $v \in V_1$ 
  - ▶ Todas as arestas ficam entre os dois conjuntos  $V_1$  e  $V_2$
- ▶ Um grafo acíclico não orientado é uma **floresta**
- ▶ Um grafo conexo acíclico não orientado é uma **árvore (livre)**

## Grafos com nomes especiais

- ▶ **Grafo completo** é um grafo não orientado no qual todo par de vértices é adjacente
- ▶ Um grafo completo com  $n$  vértices é chamado de  $K_n$
- ▶ **Grafo bipartido** é um grafo não orientado  $G = (V, E)$  em que  $V$  pode ser particionado em dois conjuntos  $V_1$  e  $V_2$  tais que  $(u, v) \in E$  implica que  $u \in V_1$  e  $v \in V_2$  ou  $u \in V_2$  e  $v \in V_1$ 
  - ▶ Todas as arestas ficam entre os dois conjuntos  $V_1$  e  $V_2$
- ▶ Um grafo acíclico não orientado é uma **floresta**
- ▶ Um grafo conexo acíclico não orientado é uma **árvore (livre)**
- ▶ **gao**: grafo acíclico orientado

## Variantes de grafos

# Variantes de grafos

- ▶ Semelhantes a grafos não orientados
  - ▶ **Multigrafo**: pode ter várias arestas entre vértices e também autoloops



# Variantes de grafos

- ▶ Semelhantes a grafos não orientados
  - ▶ **Multigrafo**: pode ter várias arestas entre vértices e também autoloops
  - ▶ **Hipergrafo**: cada **hiperaresta**, em lugar de conectar dois vértices, conecta um subconjunto arbitrário de vértices

## Referências

# Referências

- ▶ Wikipedia - Seven Bridges of Königsberg
- ▶ Thomas H. Cormen et al. Introduction to Algorithms. 3rd edition. Capítulo B.4.